



Észlelők	Észlelés	Műszer	Módszer
Bucsi Gábor /Békés/	7	8,0 L	v
Busa Sándor /Harkakötöny/	3	7,0 L	v
Czimbalmos László /Szatmár,R/	14	5,0 L	v
Farkas László /Budapest/	3	8,0 L	v
Fazakas József /Budapest/	21	15,0 T	pr,r
Iskum József /Budapest/	1	10,0 L	pr,tá
Kocsis Antal /Balatonkenese/	6	5,0 L	v,r
Kósa-kiss Attila /Nagyszalonta,	4	6,3 L	v
Mécs Miklós /Esztergom/	2	6,0 L	v,r
Dr. Prehoffer Elemér /Budapest/	16	8,0 L	pr,r
Ravasz Bálint /Gyopárosfürdő/	5	5,0 L	pr,r
Ságodi Ibolya /Szeged/	1	10,0 T	v
Vadász Sándor /Budapest/	8	12,0 T	v,r

Októberben 13 észlelő 91 vizuális megfigyelést végzett.

Napaktivitás:

Észlelt napok száma:	24
Észlelt foltcsoportok száma:	14
Foltcsoport-MDF:	0,58
Fáklya-mdf:	1,33



Az aktivitás tovább csökkent, összesen három csoport volt megfigyelhető a hónap folyamán. Az első héten a felszín inaktív, csak 3-án tűnik fel egy apró folt, pár órára.

4-én tűnik fel a keleti perem közelében egy granulált szerkezetű fáklyanező. A következő észlelés 8-án, már a CM-en ábrázolja a belőle kialakult apró, B-típusú csoportot -5^o-on. Halvány, keskeny PU képződik körülöttük. 10-én már határozott D-típusú, követője dupla folt. 13-án már csak a fáklyamezeje látható a nyugati peremnél.

14-én érdekes, feltűnő fáklya hívja fel magára a figyelmet a keleti peremen: kb. 30 ezer km-es fényes gyűrű, belseje üres /Vadász, Kocsis/. 8-15. között biztosan látható. /Pozíciómérés nem készült róla./ Vele nagyjából egy területen képződött 16-ra egy C-típusú AA. A vezető folt szabályos, a követő E-D irányban ívelt kisebb-nagyobb foltokból áll. 17-én a kettő között is kialakul egy foltocská. 19-én látszik a CM-en +5^o-on, eddig változatlan volt, most kezd elhalni a követő felől. A vezetőfolt U-ja osztódik, darabolódik. 20-án a követőből csak két pórús él. 22-én csak monopólár, 25-én nyugszik, fáklyamezővel takarva. Ezt követően újra inaktív a napfelszín.

ISKUM JÓZSEF

